


CERKARIOVÁ DERMATITIDA

CO JE TO CERKÁRIE, KTERÁ ZPŮSOBUJE CERKARIOVOU DERMATITIDU?

→ cercárie je vývojové stádium parazita – motolice ptačí. Jeho vývoj je vázán na meziphostitele, kterými jsou vodní plži. Z nich se uvolňují do vody drobné larvičky – cercárie, hledající svého konečného hostitele – vodní ptactvo jako např. kachny, labutě. Často se může zavrtávat také do kůže člověka, kde při opakovaném setkání je průnik provázen silnou imunitní reakcí, což je vlastně cercáriová dermatitida. Toto onemocnění se projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže, které je doprovázeno silným svěděním, přetrvávajícím několik dní. Cercárie brzy po napadení kůže spontánně zmírají.



- schéma životního cyklu ptačích viscerálních schistosom

PROJEVY cercáriové dermatitidy:

- zarudnutí na postižené části kůže
- otok
- kožní exantém (vyrážka), která je ohraničená zpravidla čarou, po kterou byla končetina ponořena do vody
- při opakované expozici až makulopapulózní charakter vyrážky
- intenzivní svědění
- skvrny až puchýřky na postižené části kůže
- někdy také subfebrilie až febrilie (zvýšená tělesná teplota)
- kašel
- bolesti břicha
- průjem
- výjimečně hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny)



LÉČBA cercáriové dermatitidy:

- symptomatická = zmírnění intenzity svědění a vyrážky (lokální antihistaminika, steroidy atd.)

Pokud máme podezření, že se po koupání ve volné přírodě vyskytly výše popisované příznaky, pak KHSKK doporučuje vyplnit **DOTAZNÍK** umístěný na webových stránkách krajské hygienické stanice →

www.khskv.cz/informace_pro_verejnost/koupaci_mista/koupaci_mista_1.htm

Hlášení bude hygienickou stanicí ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem prověřeno a v terénu prošetřeno.